


Fluxo de assistência aos casos suspeitos ou prováveis de COVID-19

CIEVS Minas: 31 99744-6983
notifica.se@saude.mg.gov.br
Se em Belo Horizonte ligar para o CIEVS
BH: 3277-7767 / 7768 , 98835-3120
cievs.bh@pbh.gov.br



CASO SUSPEITO:

Febre(1) e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) com histórico nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas:

- de viagem para área com transmissão local(2), de acordo com a OMS OU
- contato próximo de caso suspeito ou confirmado para o coronavírus (COVID-19)

Casos com sintomas respiratórios e vínculo epidemiológico, SEM FEBRE, devem ser discutidos com o CIEVS

(1) Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.

(2) As áreas de transmissão local atualizadas são disponíveis em: <https://saude.gov.br/saude-de-a-z/listacorona>



AÇÕES

- Fornecer máscara cirúrgica e conduzi-lo para uma sala isolada
- Profissionais de saúde que irão prestar atendimento: utilizar proteção para aerossóis e precauções de contato (máscara respiratória do tipo N95, proteção ocular, luvas, gorro, capote descartável)

Classificar o caso de acordo com a gravidade (em qualquer nível da assistência)

Caso Leve (sem sinais de gravidade) Infecção viral não complicada do trato respiratório superior: febre, tosse, dor de garganta, congestão nasal, mal estar, cefaleia, mialgia, podendo estar acompanhados de sinais e sintomas gastrointestinais. Os idosos e imunossuprimidos podem apresentar sintomas atípicos, com ausência de febre.

Sinais de Gravidade sem indicação de CTI
Sinal de esforço respiratório; Saturação de O₂ > 90% < 94%; Cianose; Alteração na ausculta pulmonar

Sinais de Gravidade COM indicação de CTI
Instabilidade hemodinâmica persistente, indicando uso de amina vasoativa
Sinais e sintomas de insuficiência respiratória, incluindo hipoxemia (PaO₂ abaixo de 60 mmHg) Evolução para outras disfunções orgânicas, como insuficiência renal aguda e disfunção neurológica.

Notificação Imediata ao CIEVS

Confirmado que trata-se de caso suspeito ou provável:

- Coletar swab oro/nasofaringe: 1 kit com meio de transporte viral, contendo 3 swabs
- Cadastrar no GAL
- Encaminhar para a FUNED para que seja entregue no período de 8 as 16h

Preencher on-line formulário RedCap: <http://bit.ly/2019-ncov> SINAN
• Notificar na ficha de NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL (CID 10 = U07.1) para encaminhamento a FUNED junto com material coletado.

(3) Avaliar criteriosamente se entre os moradores, forem detectadas as seguintes situações: pessoas com idade maior que 65 anos e/ou menor que 2 anos; com doenças crônicas pulmonares, renais e cardíacas ou portadores de imunossupressão; Gestantes. Dependendo das condições é preferível internação

Isolamento domiciliar(3) até desaparecimento dos sintomas

- Avaliar necessidade de transporte sanitário de rotina
- Antitérmico e antipirético
- Orientar sobre sinais de gravidade. Estabelecer equipe de saúde responsável pelo acompanhamento (responsabilidade do município)
- Emitir atestado médico e assinar termo de responsabilidade
- Orientar manter uso da máscara cirúrgica durante o trajeto até o domicílio
- Monitorar os contatos

Internação em serviços com leito de isolamento

- Cadastrar na Central de Regulação
- Para pacientes internados seguir conduta dos itens 4.4.2 e 4.4.3 do protocolo estadual
- Preencher ficha de notificação de SRAG
- Acionar o SAMU ou transporte de urgência
- Para conduta no transporte ver item 4.5 do protocolo estadual